



PROTOKOL ZA PRUŽANJE STOMATOLOŠKOG LIJEČENJA TOKOM EPIDEMIJE COVID-19

- **Priprema stomatološke ordinacije/poliklinike za pacijente**

1. Stomatološke ordinacije treba da budu očišćene i dezinfikovane (voditi računa da dezinficijens ostane na površinama minimum 10 minuta). Takođe, ambulanta mora biti sa adekvatnom ventilacijom, tj. prirodnom ventilacijom.

2. Prilikom ulaska u ordinaciju trebalo bi obezbijediti dezo barijeru (dezinfekcioni otirač ili obični otirač natopljen dezinficijentnim sredstvom koji sadrži hlor u conc. 1000mg/L)

3. Uklonite sve nepotrebne predmete i biljke iz čekaonica, takođe i peškire za višekratnu upotrebu u kupatilima. Obezbijedite da mjesta za sjedenje u čekaonici budu razdvojena, prema mogućnosti 2m.

4. Prorijedite zakazivanje kako biste ograničili ukupan broj ljudi u vašoj ordinaciji i izbjegli bliski kontakt između pacijenata. Ostavite dovoljno vremena (najmanje 10-15 minuta) da bi se ordinacija dezinfikovala između zakazanih pacijenata. Razmotrite da za kraj radnog vremena zakažete intervencije gdje dolazi do stvaranja aerosola (npr. rad turbinom ili ultrazvukom). Ako to nije izvodljivo, odložite ulazak u prostoriju u kojoj su proizvedeni aerosoli za najmanje 1 sat.

5. Trebalo bi reći pacijentima da dođu sami (djeca u pratnji isključivo jednog pratioca). Informišite ih i upozorite da će biti tretirani u skladu sa neophodnim postupcima da bi se spriječilo širenje COVID-19. Svi pacijenti bi trebalo da nose rukavice i maske preko usta i nosa i to ih treba obavijestiti prilikom zakazivanja.

6. Postavite ili obezbijedite sredstva za dezinfekciju ruku za pacijente. Pacijent na ulazu i po izlasku iz ordinacije sprovodi dezinfekciju ruku.

7. Kupatila treba da budu dezinfikovana posle svakog korišćenja (dezinfikovati slavinu, toalet, kvake na vratima, prekidače i držače).

8. Prije početka tretmana pacijentu dati da promućka vodicu za usnu šupljinu na bazi:

- 1% vodonik peroksidom
- 1% povidon jod (imati na umu da jod može da oboji sluznicu i zube)



9. Obavezno koristiti ličnu zaštitnu opremu u skladu sa dostupnošću:

- **partikularna maska** (standard N95, FFP2 ili ekvivalent),
- **zaštita za oči** (naočare ili vizir koji pokriva prednju i bočne strane lica). Opremu za jednokratnu upotrebu pravilno skinuti i baciti u namjensku kesu za infektivni otpad, dok opremu za višekratnu upotrebu nakon upotrebe treba očistiti i dezinfikovati,
- **zaštita za ruke** (rukavice).

- ukoliko partikularna maska nije dostupna, koristiti hiruršku masku u kombinaciji sa vizikom koji pokriva čitavo lice;
- ukoliko maska tokom obavljanja procedure postane vlažna treba je zamjeniti novom;
- ukoliko nije dostupna minimalno prihvatljiva zaštitna oprema - kombinacija hirurške maske i vizira koji prekriva cijelo lice, ne treba pružati stomatološku uslugu već pacijenta uputiti u ustanovu koja ispunjava standarde;
- protetske radove koji se šalju u dentalne laboratorije dezinfikujte dezinficijentnim sredstvom koji sadrži hlor u conc. 1000mg/L).

Nakon stomatološke procedure obaviti čišćenje i dezinfekciju prostora i opreme, kao i sterilizaciju poštujući uobičajene standardne operativne procedure.

Stavite medicinski otpad u dvoslojnu kesu za medicinski otpad i kesu dezinfikujte dezinficijentnim sredstvom koji sadrži hlor u conc. 1000mg/L).

**STOMATOLOŠKA KOMORA CRNE GORE
PREDSJEDNIK
DR.SPEC GORAN MANDIĆ**